

为什么量第二遍血压比第一次低很多、为什么用汞柱血压计自己量血压时第一遍总是比第二遍高一点？-股识吧

一、为什么我的血压越量越低

您好，由于血压具有明显的波动性，你描述的症状是一种正常的现象.如果连续测血压的话，就会出现不准确的情况.就像你描述的那样，所以临床一般不会采取连续测血压

二、电子血压计连续二次测量结果为何差很多？

是不是血压计有问题！

三、谁知道为什么血压计连续两次所测得的血压值不一样怎么回事

建议：血压是有波动的，还有测血压时很多因素都影响结果一般情况下出现这种情况应该是测量不准确导致的，导致测量不准确的原因常见的是位置、袖带的压力差，如果你在测量第二次时袖带内的空气没有放完，或者换手测量，结果都是会受影响的，如果排除了这些因素，那么就可能是血压计自身的因素了

四、在用水银测压仪测压时为什么第一次的血压总要比第二第三次高

多次测量会影响数值。

- 。
- 。
- 因为第一次测量的时候没有被气囊压迫所以会比其他两次要高。
- 。
- 。
- 因此第二和第三次已经收了压迫所以血压不会高过第一次。

-
-
- 所以一天测一次就够了。
-
-

五、为什么用汞柱血压计自己量血压时第一遍总是比第二遍高一点？

您好！测血压：1、测前，先要“稳”上3 - 5分钟；
2、一般上要测上三次，再取平均值；
1、大部分都是第一次高一些，属于正常现象。

六、为什么第一次量的血压和第二次量的不一样？

展开全部血压是一直都在变的，几分钟里面也会变得不一样。
如果你的两次血压是连着测的，那第二次一定是不准的，因为你的血管已经经过一次束缚了，自然第二次就会不正确。
一般而言，血压值只有连着测3次中间间隔半小时，取中间值那个才是最准的。

七、电子血压计连续二次测量结果为何差很多？

是不是血压计有问题！

八、为什么在家自测血压比在医院测得的低

您好！测血压：1、测前，先要“稳”上3 - 5分钟；
2、一般上要测上三次，再取平均值；

1、大部分都是第一次高一些，属于正常现象。

九、电子血压计连续二次测量结果为何差很多？

用电子血压计测血压，为啥每次结果相差很多？这个问题要注意

参考文档

[下载：为什么量第二遍血压比第一次低很多.pdf](#)

[《证券转股票多久到账》](#)

[《一只股票多久才能涨》](#)

[《当股票出现仙人指路后多久会拉升》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[下载：为什么量第二遍血压比第一次低很多.doc](#)

[更多关于《为什么量第二遍血压比第一次低很多》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/18158144.html>