

口服药比外用药剂量大怎么办；如何合理用药?-股识吧

一、求助咨询口服药的用量

回复 1# 唐力降糖作用比拜糖平强多了，餐后11点多你应看医生增加唐力的量，唐力通过肝胆排泄，对肾副作用最小。

二、同种中药外用量能比内服大吗？

同种中药外用量大些是完全可以的

三、药物食用过量怎么办

展开全部病情突发时，经常会出现用错药(包括剂量、用法等)的情况。

药物过量后，总的处理原则是，一、注意当时的不良反应，避免意外伤害；

二、多喝水，促进药物代谢；

三、反应严重者要去医院就诊，根据情况进行输液、洗胃或者催吐等。

通常来说，目前常用的口服抗生素多数安全性比较好，如果一次吃掉一天的剂量，理论上问题应该不是很大，但它们毕竟不是非处方药，不要太大意。

感冒药多是非处方药，安全性比较好，如果服用剂量比说明书建议的剂量多出了1~2倍，危险应该不会太大。

不过，药物在人体内有一个代谢、排泄的过程，如果已经过量服用1~2倍，就应间隔1~2次后再服用，否则药物浓度过大，容易导致不良反应。

对于退烧药，如果服用过量，可能会导致患者出汗过多，体质虚弱者容易发生虚脱，所以患者要尽量卧床休息，多喝水。

因为这类药物都是患者在发烧时临时服用，用药过量后，需要根据患者的体温情况决定何时开始服用下一次药物。

使用降糖药、胰岛素和降压药的患者，如果过量服用药物，不良反应会比较明显，例如，降糖药和胰岛素过量，会导致低血糖，出现头晕、出虚汗等症状，严重时出现低血糖晕厥；

降压药过量，会导致低血压、脑供血不足，导致头晕，甚至危及患者生命安全等。

因此，如果上述药物过量，需要积极补救。

如果是降糖药过量，应立即加主食，如糖块、馒头等，监测血糖，根据血糖的情况

决定是继续用药、调整药量，还是暂停一次。
如果是降压药过量，要尽快躺下休息，监测患者血压情况，决定何时继续用药。
如果患者有明显不适，应及时到医院就诊。

四、为什么医生开的药量比说明书的药量要大得多

副作用写明只是为了告知患者，吃这种药可能会产生什么样的后果，可能发生并不代表一定会发生，副作用发生的比率比较小的，所以不必过分紧张！

五、如何合理用药？

首先要了解概念其次自己要熟悉医学常识自己阅读说明书特备是孕期 哺乳期 儿童 老年人用药都有特别的规定问问好的医师或者药师他们会跟你免费讲解的相信世界上好人多的很祝你健康

参考文档

[下载：口服药比外用药剂量大怎么办.pdf](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[《股票多久能买完》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[下载：口服药比外用药剂量大怎么办.doc](#)

[更多关于《口服药比外用药剂量大怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/25218490.html>

