

## 女朋友大姨妈量比平时少什么原因\_月经量很少是什么原因-股识吧

### 一、女人月经少是咋回事。

一般女性正常经期是3-7天，如果少于或多于这个天数，就要去医院做个检查，是不是内分泌失调，平时准备来例假的时候就要注意卫生，不要吃冷，热，辣的东西，肚子要保暖，不要过度劳累。

### 二、

### 三、月经为什么比原来少

是不是有妇科炎症。

### 四、我女友每次来月经的时候量都很少，是怎么回事啊？拜托了各位 谢谢

这样不好吗 月经周期基本正常，经量明显减少，甚或点滴即净，或经期缩短不足两天，经量也少者，称为月经过少，又称经水涩少。

一般认为经量少于30毫升，相当于西医月经不调中的月经稀少。

月经周期正常，经量很少，甚或点滴即净；

也有经期缩短不足两天，经量亦少，为本病的诊断要点。

本病常为闭经的前驱表现。

月经过少可与月经周期异常并见，如月经先期量少或月经后期量少。

如属口服避孕药或肌注避孕针而导致月经过少，则应停药，并可参照本病论治。

月经过少的诊断，一般是指连续发生二次以上。

如一贯月经正常，突然月经过少者，应注意是否受孕早期的先兆流产，或异位妊娠

所表现的少量阴道出血，必须进一步做有关检查以鉴别。

经期血量过少应警惕 正常情况下，一次月经出血量约为60毫升左右，低于30毫升为过少，超过80毫升为过多。

怎样知道自己的月经量是否正常呢？卫生巾可以帮我们的忙。

一般来说，每个周期的用量不超过两包（10片/包），如果超过三包，且每片都是湿透的，就属月经过多；

如果每次一包都用不到，而且每片的血量很少，就属月经过少，这两种情况都属异常。

一般来说，经血量少，是由于雌激素水平低而引起的。

雌激素可刺激子宫内膜的增生变厚，为受孕做准备。

如果未受孕，增生的内膜会脱落出血形成月经。

体内雌激素水平低会导致子宫内膜增生得不够厚，月经时出血少，这种情况日后是会影响受孕的。

但初潮后不久的少女，体内雌激素分泌还没有达到平衡稳定状态，因此一般经血量都不多，而且月经有时提前有时错后来，都是正常的。

即使在形成规律的月经周期，或出血量也较稳定后，但遇上情绪紧张，环境改变，或心理压力加大，或突然变故的刺激等，都有可能致内分泌的暂时性紊乱，使雌激素分泌增减，使经血量增多或减少，只要以上暂时性因素消失，月经又可恢复正常。

还有一种情况是因为营养不良引起的。

有些女孩有挑食、偏食的习惯，身体瘦弱；

还有的人为了减肥而刻意减少食物摄入量，导致营养供给不够。

但青春期身体发育迅速，繁重的学习任务 and 较大的活动量要消耗较多能量，需要补充足够的营养和热量，如果吸收的养分不足以满足身体的需要，身体产生防御性反应，也可能引起经血量过少，甚至闭经。

这种情况不仅引起子宫等生殖系统发育不良，为未来患不育症埋下隐患，而且会引起全身免疫功能的下降，为疾病的侵蚀创造条件。

青春期少女应多学习一些保健方面的知识，切不可因无知而损害自己的身体。

如果月经周期稳定后经血量持续过少，又不是因为营养缺乏造成的，同时发现身体发育不理想，如乳房、臀部隆起不明显，就要引起警惕，需要尽快去医院就诊，检查雌激素水平。

发现雌激素偏低还要寻找偏低的原因，多数是由于内分泌系统的疾病所引起。

找出病因进行治疗，在医生的指导下补充雌激素，是能够改变月经状况的。

## 五、月经量少是咋回事

您好，影响月经的原因是有很多的，一般压力 心情 炎症 药物 手术 内分泌问题 相关方面都会直接影响到月经情况，最好是在医院检查明确的。

## 六、月经量比以前少怎么回事？

你好：、

月经过少是指，月经周期正常，每次行经天数短与2天，经血量每次不超过20ml。经血量色淡或深。

- 1、月经过少多由脑垂体功能低下，卵巢分泌雌激素不足，体内雌激素水平较低，使子宫内膜增生不足，内膜较薄引起的；  
长期服用避孕药物也可以引起，
- 2、以及子宫内膜病变如：子宫内膜发育不良、粗暴刮宫损伤了内膜、内膜结核。  
建议严密观察，对症治疗。

u

## 七、月经量很少是什么原因

志在天涯未自躭，三分浊酒三分熟。  
斜阳西下映水浒，无边千路是独孤

## 参考文档

[下载：女朋友大姨妈量比平时少什么原因.pdf](#)

[《买股票怎么买+第一次》](#)

[《游资拉高股票怎么出货新手必知》](#)

[《股票涨到十个点为什么还在上涨》](#)

[下载：女朋友大姨妈量比平时少什么原因.doc](#)

[更多关于《女朋友大姨妈量比平时少什么原因》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/63349680.html>