

# 美柚怎么通过股骨长算体重！怎么算胎儿体重胎头双顶径约8.7股骨长6.9-股识吧

## 一、怎么样通过BC数据计算胎儿体重啊？

预测胎儿体重公式一胎儿体重(克) = 260.69乘以HC(头围) 减  
4973.72  
预测胎儿体重公式二胎儿体重(克) = 171.48乘以AC(腹围) 减  
2686.60  
预测胎儿体重公式三胎儿体重(克) = 747.42乘以FL(股骨长) 减  
2232.56  
预测胎儿体重公式四胎儿体重(克) =  
1049.90乘以FTH(胎儿腿部皮下脂肪厚度) 减  
2513.51  
预测胎儿体重公式五胎儿体重(克) = 100.97\*HC(头围) + 110.86\*AC(腹围) +  
143.09\*FL(股骨长) + 331.43\*FTH(胎儿腿部皮下脂肪厚度)减  
5168.32  
预测胎儿体重公式六胎儿体重(克) = 900乘以BPD(双顶径) 减  
5200  
预测胎儿体重公式七胎儿体重(克) = 2900 + 0.3乘以宫底高 乘以胸围  
预测胎儿体重说明以上计算公式仅为估算，并不代表婴儿出生的实际体重。  
预测胎儿体重的目的在于要及早发现胎儿发育上存在的问题。  
一般来说，出生时的实际体重与预测体重会有正负10-15%的误差。  
比如，出生体重4000克，其误差范围会为400克。  
也就是说，宝宝体重越大，误差范围也就越大。

## 二、怎样算宝宝体重啊？双顶径67mm.股骨长42mm.宝宝有多重

双顶径乘900再减去5200就是宝宝的估重

## 三、只有双顶径和股长怎么算胎儿体重？

体重大约3.1千克。  
胎儿的头感觉稍小

## 四、怎样计算胎儿体重，现38周+.双顶径约9.2.股骨长约7.0cm.

这里有七种预测胎儿体重计算公式

但出生时的实际体重与预测体重会有正负10-15%的误差。

下面介绍预测胎儿体重公式. 预测胎儿体重公式一 胎儿体重(克) = -4973.72 +

260.69\*HC(头围) 预测胎儿体重公式二 胎儿体重(克) = -2686.60 + 171.48\*AC(腹围)

预测胎儿体重公式三 胎儿体重(克) = -2232.56 + 747.42\*FL(股骨长)

预测胎儿体重公式四 胎儿体重(克) = -2513.51 +

1049.90\*FTH(胎儿腿部皮下脂肪厚度) 预测胎儿体重公式五 胎儿体重(克) = -5168.32

+ 100.97\*HC(头围) + 110.86\*AC(腹围) + 143.09\*FL(股骨长) +

331.43\*FTH(胎儿腿部皮下脂肪厚度) 预测胎儿体重公式六 胎儿体重(克) =

900\*BPD(双顶径) - 5200 预测胎儿体重公式七 胎儿体重(克) = 2900 +

0.3\*宫底高\*胸围 预测胎儿体重说明

以上计算公式仅为估算，并不代表婴儿出生的实际体重。

预测胎儿体重的目的在于要及早发现胎儿发育上存在的问题。

一般来说，出生时的实际体重与预测体重会有正负10-15%的误差。

所以要有准确的胎儿体重计算公式目前一般仪器还达不到我们所要的准确度.肯定是会有相差度的.

## 五、怎样根据双顶径和股骨长判断婴儿体重

怀孕35周了双顶径8.0&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

请问胎儿体重正常多少 &nbsp;

## 六、怎样算宝宝体重啊？双顶径67mm.股骨长42mm.宝宝有多重

一般算体重最重要的是胎儿腹围数值！没有腹围误差会大！38周的数据宝宝估计6.5斤左右！32周的数据估计4斤差点！

## 七、怎么算胎儿体重胎头双顶径约8.7股骨长6.9

您好：给您一个完全版的胎宝体重测算公式 意见建议：AC —— 腹围 APTD —— 腹部前后间的厚度，又称为“腹部前后径”。在检查胎儿腹部的发育状况以及推定胎儿体重时，需要测量该数据。BDP —— 双顶径 头部左右两侧之间最长部位的长度，又称为“头部大横径”。当初期无法通过CRL来确定预产日时，往往通过BPD来预测；

中期以后，在推定胎儿体重时，往往也需要测量该数据。CRL —— 头臀长为头臀距，表示胎体纵轴平行测量最大的长轴，主要用于判定孕7~12周的胎龄。HC —— 头围 FL —— 股骨长 胎儿的大腿骨的长度，又称为“大腿骨长”。大腿骨是指大腿根部到膝部的长度。一般在妊娠20周左右，通过测量FL来检查胎儿的发育状况。GS —— 胎囊 月经规则的妇女，停经35天，B超就可在宫腔内看到孕囊。在怀孕1.5个月时孕囊直径约2厘米，2.5个月时约5厘米。胎囊位置在子宫的宫底，前壁，后壁，上部，中部都属正常；

形态圆形，椭圆形，清晰为正常；

如胎囊为不规则形，模糊，且位置在下部，孕妇同时有腹痛或阴道流血时，可能要流产。HL —— 肱骨长 TTD —— 腹部的宽度，又称为“腹部横径”。在妊娠20周之后，与APTD一起来对胎儿的发育情况进行检查。有时也会测量腹部的面积 GP ——

胎盘分级，一般胎盘分为0，I，II，III级，有时还有III+级 AFI —— 羊水指数，做B超时，以孕妇的脐部为中心，分上，下，左，右4区域，将4个区域的羊水深度相加，就得到羊水指数，孕晚期羊水指数的正常值是8~18（24）厘米。S/D —— 胎儿脐动脉收缩压与舒张压的比值，与胎儿供血相关，当胎盘功能不良或脐带异常时此比值会出现异常，在正常妊娠情况下，随孕周增加胎儿需要增加S下降，D升高，使比值下降，近足月妊娠时S/D小于3。胎儿体重预测：公式1：

$Y = -4973.72 + 260.69HC$  公式2： $Y = -2686.60 + 171.48AC$  公式3：

$Y = -2232.56 + 747.42FL$  公式4： $Y = -2513.51 + 1049.90FTH$  公式5：

$Y = -5168.32 + 100.97HC + 110.86AC + 143.09FL + 331.43FTH$  公式6： $Y = -$

$5200 + 900 * BPD$  说明：1. 可以使用其中任一个公式计算，公式5的精度最高。2.

参数的含义如下，参数可以从B超单中查到：Y：胎儿体重的估算值(g) HC：头围 AC：腹围 FL：股骨长 FTH：胎儿腿部皮下脂肪厚度 其他方法：(宫高CM-11)\*155 /：(宫高CM-12)\*155=前的是已经入盆/后的是未完全入盆

还有： $900 * HC - 5200 =$ 宝宝体重

## 八、双向径怎么预测体重

一般算体重最重要的是胎儿腹围数值！没有腹围误差会大！38周的数据宝宝估计6.5斤左右！32周的数据估计4斤差点！

## 参考文档

[下载：美柚怎么通过股骨长算体重.pdf](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[《股票回购多久才能涨回》](#)

[《小盘股票中签后多久上市》](#)

[下载：美柚怎么通过股骨长算体重.doc](#)

[更多关于《美柚怎么通过股骨长算体重》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/22969621.html>