

取用液体时如果量比较多~取用液体药品时，最少量是多少？-股识吧

一、取用药品，如果实验没有规定用量，固体和液体各应取用多少量

各一半或者3：2

二、取用较多量液体时，用什么法？

多少啊

三、如果用量筒量取水时仰视读数，则实际量取的水比需要的水要多还是少？

偏小 因为量取液体时，仰视会导致量的水比预计的多！
水多了，溶液变稀了，质量分数偏小了 仰视读数看的比实际的水少了
所以浓度偏大 偏小。

四、取用液体药品时，最少量是多少？

实验室取用药品，如果没有说明用量，一般取最少量，液体只要不超过 $\frac{3}{1}$ ，其中固体取盖满试管底部，液体最多不能超过试管的 $\frac{3}{1}$

五、取用块状固体必须做到：取用粉末固体必须： 定量取用固体药品要用到：取用少量液体用：，较多则：，定

液体药品通常盛放在细口瓶里，取用细口瓶里的药品时，先拿下瓶塞，倒放在桌上，然后拿起瓶子，瓶口要紧挨着试管口，使液体缓缓地倒入试管，注意，标签要对着手心，倒完要将瓶口放在试管口刷一下，以防液体流下腐蚀标签，倒完液体，立即盖紧瓶塞，把瓶放回原处，让标签向外。

取用一定量的液体药品，也可以用量筒出体积，量液体时，量筒必须放平，视线要跟量筒内液体的凹液面最低处保持水平，再读出液体的体积数。

滴管是用来吸取和滴加少量试剂的一种仪器，滴管上部是橡胶乳头，下部是细长尖嘴的玻璃管，使用滴管时，用手指捏紧橡胶乳头，赶出滴管中的空气，然后把洋管伸出试剂瓶中，放开手指，试剂即被吸入。

取出滴管，把它悬空放在烧杯上方，然后用拇指和食指轻轻捏挤橡胶乳头，试剂使滴入烧杯中。

使用滴管时要注意：取液后的滴管，应保持橡胶乳头在上，不要平放或倒置，防止试液倒流。

以防腐蚀胶头，用过的滴管要立即用清水冲洗干净，以备再用，严禁用未经清洗的滴管再吸取别的试剂。

（滴瓶上的滴管是专用的，不要用水冲洗。）

六、取用液体药品时，最少量是多少？

一滴，0.05ml.

七、实验室中取用药品时，如果没有说明用量，一般要按()取用，液体只要()，固体只()，液体最多不能()。

实验室取用药品，如果没有说明用量，一般取最少量，液体只要不超过 $\frac{3}{1}$ ，其中固体取盖满试管底部，液体最多不能超过试管的 $\frac{3}{1}$

参考文档

[下载：取用液体时如果量比较多.pdf](#)
[《证券转股票多久到账》](#)

[《股票跌停板后多久可以买入》](#)

[《股票赎回到银行卡多久》](#)

[下载：取用液体时如果量比较多.doc](#)

[更多关于《取用液体时如果量比较多》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/29722991.html>