

量血压为什么左胳膊比右胳膊高；测量血压左右臂为什么不一样-股识吧

一、测量血压左右臂为什么不一样

建议：你好，测血压一般都是测量右手臂的，因为右手臂是一个动脉的主支，而左手臂是另一个动脉的分支，所以一般右手臂稍高。但也有特殊的。

二、测试血压左臂正常，右臂超高，以谁为准

一般情况下，二边测的血压是不一样的，但是相差不应该太多。你的左臂血压正常，右臂是超高，相差太多了，重复测一下看看，如果还是差的多，就要找原因了。不能大意。

三、量血压应该量左胳膊还是右胳膊？

严格讲需要两支胳膊都测

四、左胳膊血压低右胳膊血压高是怎么回事

健康人两上肢的血压可不相等，左右两侧血压相差约为10~20mmHg，一般是右侧高，左侧低。

引起右侧高、左侧低的原因有：右肱动脉与左肱动脉的来源与压力不同所致：右肱动脉来自主动脉的第一分支，即头臂干，为大的分支，其动脉压力大，使右臂血压偏高；

而左肱动脉来自主动脉的第三分支，即左锁骨下动脉，为较小的分支，所耗能量较多，压力较小，血压偏低，一般右上肢较左上肢血压值高约20mmHg。

所以，目前一般测量血压选择以右上肢为准。

如果两侧血压差明显不等，可见于动脉瘤、多发性大动脉炎，无名动脉或锁骨下动脉受压、先天性动脉畸形等。

一、结合你朋友情况，左115，右140，左右压差为25，比正常压差增大，应除外病理情况可能。

建议：1、再反复测量几次血压，测量时建议使用水银柱血压计，采取坐位，上臂位置应与心脏水平一致，两侧袖带松紧度一致等。

2、如以反复核实，两臂血压差仍在20以上，应做有关检查，除外左侧血管病变，如动脉瘤、多发性大动脉炎，无名动脉或锁骨下动脉受压、先天性动脉畸形等。

二、测量血压应以右侧为准，右侧血压 140/85，高压已达到高血压标准，但一次血压还不宜定高血压，如经不同时间，三次以上血压均超过140/或90，则应为诊断为高血压。

五、我想咨询一下为什么我的左胳膊和右胳膊量出来的血压差别比较大？

建议在当地医生的指导下选择降压药物治疗，如心痛定，最好选择缓释片治疗，如波依定或者寿比山治疗，有很好的效果。

平时多吃芹菜尤其是其根部，有降压作用，但是只是辅助治疗。

主要还是靠药物治疗。

六、两个胳膊血压不同 以哪个为准

临床上人们习惯以右臂为准。

因为人右臂的血液供应来自于右侧肱动脉，左臂血液供应来自左肱动脉；

而右肱动脉来自于主动弓的第一大分支----无名动脉（也叫头臂干动脉），而左肱动脉来源于主动弓第三大分支----左锁骨下动脉。

所以右侧比左侧更能准确的反应出血压的高低，而不是左侧离心脏近就准确。

七、为什么左胳膊和右胳膊量出来的血压值不一样

可能血管内有东西、建议去医院检查下

参考文档

[下载：量血压为什么左胳膊比右胳膊高.pdf](#)

[《股票为什么盘子很小股价很低》](#)

[《合盛硅业股票什么时候发年报》](#)

[《什么时候股票建仓比较好》](#)

[《天天基金的查理智投怎么样》](#)

[下载：量血压为什么左胳膊比右胳膊高.doc](#)

[更多关于《量血压为什么左胳膊比右胳膊高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/50101484.html>