

# 量血压坐着比躺着低是什么原因呢，急 ===站起来血压高坐着躺在血压就正常 是什么病啊-股识吧

## 一、坐着和躺下血压为什么不一样?

这个解释起来很复杂。

- 1、因为坐着时，臀部和腿部的大腿部的压强大于躺着时，此部分血管不如正常情况饱满，血液对它的压力便会转移到全身，顾此时量血压的胳膊会比躺着时要稍高（理论上是这样的，但不会高多少的）。
- 2、坐着和躺着时，心脏所处的位置相对于仪器来说是不一样的，应该是坐着时的血压要稍大于躺着时。
- 3、两个姿势下，血液的动能和重力势能转化的程度不一样，故而对血管壁的压力也不一样。

&nbsp; ;

&nbsp; ;

高中时我是物理帝，所以希望我的解释能解开你的疑惑。

不谢.....还有，我现在在做五谷养生，有需要可以@我。

## 二、高血压头晕怎么办 高血压 血压躺着高坐着低怎么办

双侧肾上腺增生的处理 哈尔滨医科大学第一附属医院泌尿外科安瑞华：双侧肾上腺增生在治疗前需要明确两个主要内容。

第一是原发的肾上腺增生，还是继发于脑垂体肿瘤。

因为肾上腺是受到脑垂体的“指挥”，当脑垂体肿瘤时可以调节双侧肾上腺增生。

此时治疗的重点是脑垂体肿瘤。

如果是原发的肾上腺增生，就要处理肾上腺。

第二是明确肾上腺增生是否伴有功能的增加。

需要检查血皮质醇激素水平，如果增高明显，并且脑垂体正常（需要做垂体激素测定），可以手术切除增生明显的肾上腺，观察疗效。

如果术后皮质醇正常，只需要定期检查。

如果皮质醇仍然高，可以将单侧肾上腺部分切除。

留部分肾上腺就可以维持其功能。

哈尔滨医科大学附属第一医院泌尿外科安瑞华患者：病情描述（发病时间、主要症状、就诊医院等）：患者男47；

96年发现高血压；  
2007年检查为双侧肾上腺增生；  
一直服用倍他乐克；  
2022年8月腰疼的很；  
请问要怎么治、在哪家医院、

### 三、老人躺着血压正常一坐起来血压就很低是怎么回事

高血压主要有两种类型：一是原发性高血压，通常指不名原因引起的高血压，二是继发性高血压，它是由某些疾病引起的高血压，建议低盐饮食，低脂肪饮食.一定要禁烟，酒，避免情绪激动.如果有高血脂必须同时治疗啊.否则降压效果不好.

### 四、我有颈椎病躺着血压正常坐着量血压就高怎么回事有没有喝药

你好，躺着血压比坐着血压低的，主要原因是躺着的时候，心脏射血量会减少，会导致血压相对低一些，坐着的时候，机体需血量增加，就会导致血压相对升高。颈椎病建议就诊骨科给与做颈椎CT检查，明确后给与活血药物治疗的。

### 五、血压低啥原因?

双侧肾上腺增生的处理 哈尔滨医科大学第一附属医院泌尿外科安瑞华：双侧肾上腺增生在治疗前需要明确两个主要内容。

第一是原发的肾上腺增生，还是继发于脑垂体肿瘤。

因为肾上腺是受到脑垂体的“指挥”，当脑垂体肿瘤时可以调节双侧肾上腺增生。此时治疗的重点是脑垂体肿瘤。

如果是原发的肾上腺增生，就要处理肾上腺。

第二是明确肾上腺增生是否伴有功能的增加。

需要检查血皮质醇激素水平，如果增高明显，并且脑垂体正常（需要做垂体激素测定），可以手术切除增生明显的肾上腺，观察疗效。

如果术后皮质醇正常，只需要定期检查。

如果皮质醇仍然高，可以将单侧肾上腺部分切除。

留部分肾上腺就可以维持其功能。

哈尔滨医科大学附属第一医院泌尿外科安瑞华患者：病情描述（发病时间、主要症状、就诊医院等）：患者男47；

96年发现高血压；

2007年检查为双侧肾上腺增生；

一直服用倍他乐克；

2022年8月腰疼的很；

请问要怎么治、在哪家医院、

## 参考文档

[下载：量血压坐着比躺着低是什么原因呢.pdf](#)

[《股票从业资格证需要多久》](#)

[《科创板股票申购中签后多久卖》](#)

[《股票多久能买完》](#)

[下载：量血压坐着比躺着低是什么原因呢.doc](#)

[更多关于《量血压坐着比躺着低是什么原因呢》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/52464348.html>