

女性经期量多少比较正常正常女性月经周期出血量是多少-股识吧

一、月经正常量为多少

50-100

二、月经一次来多少算正常？

月经来潮的持续时间一般为3-7天，出血量在100毫升之内，以第2-3天为最多。月经血一般呈暗红色，不凝固，除血液外，还含有子宫内膜碎片、宫颈粘液及阴道上皮细胞。

一般来说，月经在5到七天左右，前1到3天经血量会较多，有时还会出现血块，合并下腹部的闷痛等。

如果月经持续时间过长，超过8天以上，建议去医院进行相关的妇科检查，了解月经持续时间长的原因，是否是月经不调的表现。

三、月经量多少才算正常啊

这个不好说，因为每个人的体制不同，但是大多数是一勺子多就可以了

四、正常女性月经周期出血量是多少

您好！正常月经有赖于大脑皮层--丘脑下部--垂体--卵巢--这个之间的功能协调，若其中任何一个环节发生异常，都会导致月经失调。

正常的月经量在50-80ml，月经周期4-7天，如在原来的基础上突然发生改变需要引起重视，建议来院做激素水平的检查明确。

祝您健康！

五、月经量一般多少才算正常？

少女月经正常与否的判断周期：

一般女子的月经周期是28-30天，但也有人40天来一次月经。

但只要有规律性，均属于正常。

另外，月经容易受多种因素影响，所以提前或错后3-5天，也是正常现象。

如果这次月经周期是20天，下次是40天，而且经常出现这种情况，有的甚至月经来1-2天，过10多天又来1-2天，失去了周期性，这属于月经不调。

少女初潮时，由于卵巢刚发育，功能还不完善，所以会出现功能紊乱和不规律，这不是病理现象。

行经期：女子的月经期大约是2-5天。

一般行经的规律是第一天经血不多，第二三天增多，以后逐渐减少，直到经血干净为止。

这是因为第一天子宫内膜脱落刚刚开始，第二三天子宫内膜脱落增多，出血量也增多了，子宫受到刺激，加强收缩，把大量经血排出的缘故。

有的人经血干净了以后，过一两天又来了一点，俗称“经血回头”，这也不是病，而是一种正常现象。

但是，有的女子经期长达10-20天，月经淋漓不尽；

有的经期极短，只是“一晃”即过。

这两种现象都是不正常的。

经血量：女子月经量的多少因人而异，一般是20-100毫升。

一般每天换3-5次卫生巾或纸，就算是正常。

如果经血量过多，换一次卫生巾或纸很快就又湿透，甚至经血顺腿往下淌，这就不正常了。

经血过多，可能是精神过度紧张、环境改变、营养不良以及代谢紊乱等因素引起的功能性子宫出血。

经血长期过多会引起贫血，应查明原因，进行治疗。

当然，如果因为子宫、卵巢不正常或全身性疾病，引起月经量过少，这种情况也不正常，应及时就医。

青春期的少女以月经量过多较为常见。

其主要原因是在青春发育期，卵巢功能尚未完全成熟，这时候的月经一部分属于无排卵性的。

没有排卵就没有黄体，没有黄体就缺少孕酮。

因此，子宫内膜只能处于增殖期而不能达到完善的分泌期，以致子宫内膜脱落不完全而影响子宫的收缩，造成经血过多。

此种情况如不引起注意，久而久之，可出现面色苍白、乏力、头晕等贫血症状，应就医治疗。

经血颜色：正常的血是暗红色的，血中混有脱落的子宫内膜小碎片、宫颈粘液、阴道上皮细胞，无血块。

如果经血稀薄如水，仅有点粉红色或发黑发紫，则是不正常的。
如果经血完全是凝血块，也不正常，可能另有出血的部位，应及早就医，保证身体健康。

六、女人正常的月经量是多少

30到80毫升。

七、正常的月经量是多少

一般正常的月经量在50-80ml，月经期间中间两三天量较大，如果在平时月经规律月经量正常的情况下，一旦出现月经量增多或是减少的情况，不排除疾病的存在，具体的需要来院做相关检查明确诊疗。

八、女人月经量标准的最少是多少啊

一般正常的月经量在50-80ml，月经期间中间两三天量较大，如果在平时月经规律月经量正常的情况下，一旦出现月经量增多或是减少的情况，不排除疾病的存在，具体的需要来院做相关检查明确诊疗。

????

[?????????????????.pdf](#)

[????????????????????](#)

[??????????????](#)

[????????????????](#)

[?????????????????.doc](#)

[?????????????????????????????...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/55828989.html>