

为什么在家量的血压比在医院量的低 - - 为什么在家量的血压比在医院量的低-股识吧

一、为什么我的血压越量越低

您好，由于血压具有明显的波动性，你描述的症状是一种正常的现象.如果连续测血压的话，就会出现不准确的情况.就像你描述的那样，所以临床一般不会采取连续测血压

二、为什么用鱼跃血压计在家测得的血压值和医院的测量结果不一样？

你好！可能和活动，紧张等多因素有关系的。
仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

三、在家测血压为什么和在医院测的数值不一样

首先看你用的仪器，如果是电子血压计，它的数值就会波动，不是很准确，就是水银血压计测量但如果你是饭后或者运动完后测，它和你平时量也会有差别。医院里一般也用原始的水银血压计，这个比较准确，误差小，但是差别肯定有，关键看你每次测量的时间、状态是否一致。

四、为什么用鱼跃血压计在家测得的血压值和医院的测量结果不一样？

将手腕带下面部分拉紧系好，并注意不要留有缝隙，如手腕带捆绑不正确，将无法精确测量。

B、测量中姿势是否正确：血压实质上是一种液体压力。
将手举起测得的血压值会低，将手垂下测得的血压值会高。

因此，测量时请务必坐正，尽量保证每次测量时，头顶至心脏的垂线距离概略相等，并使手腕带与心脏位置同高。

C、测量中是否有说话或移动？活动、说话、饮酒、饥饿、饱餐、疲劳、紧张、心情不畅等，都会引血压的变化。

因此，请选择好测量时机，并在整个测量过程中，务必自然放松，尽量不要活动和说话。

D、手掌不要用力，自然张开，不要握拳。

五、为什吗在家量的血压要比去医院量的低？

那要看你是怎么去医院的啊 运动过后 血压会出现升高的现象

还有就是血压计的不同也会导致 一般医院用的水银柱的血压计要准确一点

六、为什么在家量的血压比在医院量的低

那要看你是怎么去医院的啊 运动过后 血压会出现升高的现象

还有就是血压计的不同也会导致 一般医院用的水银柱的血压计要准确一点

七、在家测血压为什么和在医院测的数值不一样

首先看你用的仪器，如果是电子血压计，它的数值就会波动，不是很准确，就是水银血压计测量但如果你是饭后或者运动完后测，它和你平时量也会有差别。

医院里一般也用原始的水银血压计，这个比较准确，误差小，但是差别肯定有，关键看你每次测量的时间、状态是否一致。

参考文档

[下载：为什么在家量的血压比在医院量的低.pdf](#)

[《中信证券卖了股票多久能提现》](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[下载：为什么在家量的血压比在医院量的低.doc](#)

[更多关于《为什么在家量的血压比在医院量的低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/18660436.html>