

2岁宝宝什么时候量体温比较准确——两岁幼儿的正常体温是多少-股识吧

一、两岁幼儿的正常体温是多少

两岁幼儿的正常体温是36.9 ~37.5

二、2岁孩子多少度算髮烧

你好，體溫不超過37度是沒事的，建議多喝熱水觀察看看吧。

三、什么时候量体温最准

病情分析：根据你提供的情况，可以放心，是正常的情况，体温是随着天气与情绪的变化有波动的范围，35.5-37.2 都是正常的。

意见建议：及时的自我调理，一般的可以采取腋下测量体温。

四、2岁宝宝体温多少正常

36.5-37度。

五、小孩子的体温在什么时候是正常的

正常体温参考值 口腔体温范围36。

7 ~ 37。

7 之间 腋窝温度范围36。

0 ~ 37。

4 之间 直肠温度范围36。

9 ~ 37。

9 之间 宝宝发烧应急3要素 第一，少穿衣服，给孩子散热。

传统的观念就是孩子一发烧，就要用衣服和被子把小孩裹得严严实实的，把汗“逼”出来，其实这是不对的。

小孩在发烧时，会出现发抖的症状，父母会以为孩子发冷，其实这是因为他们体温上升导致的寒。

第二，帮孩子物理降温，有以下常用方法：1.头部冷湿敷：用20 -30 冷水浸湿软毛巾后稍挤压使不滴水，折好置于前额，每3-5分钟更换一次。

2.头部冰枕：将小冰块及少量水装入冰袋至半满，排出袋内空气，压紧袋口，无漏水后放置于枕部。

3.温水擦拭或温水浴：用温湿毛巾擦拭孩子的头、腋下、四肢或洗个温水澡，多擦洗皮肤，促进散热。

4.酒精擦浴：适用于高热降温。

准备20%-35%的酒精200-300毫升，擦浴四肢和背部。

第三，补充充足的水分，不要随便吃药。

高热时呼吸增快，出汗使机体丧失大量水分，所以父母在孩子发烧时应给他充足的水分，增加尿量，可促进体内毒素排出。

六、二岁半的宝宝体温多少正常

正常小儿的基础体温为36.5 ~37.7 。

一般当体温超过正常体温1 以上时，可认为发热。

不过只是指肛温，宝宝测肛温比较准，而且快 ;

七、两岁幼儿的正常体温是多少

两岁幼儿的正常体温是36.9 ~37.5

参考文档

[下载：2岁宝宝什么时候量体温比较准确.pdf](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：2岁宝宝什么时候量体温比较准确.doc](#)

[更多关于《2岁宝宝什么时候量体温比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/51257687.html>