

躺着量血压为什么比坐着低很多 - - 为什么量血压时坐着和躺着不一样【坐着95-股识吧

一、为什么人的血压躺着比坐着低

躺着心脏到人体最高点的高差就小了，也就不需要使那么大的劲了。

二、为什么我平躺测量血压和坐着测量血压值不一样，躺着正常，坐着高压140，低压90

坐着与躺着的血压即便有一点偏差，但差的不会太多的。你这个已经是临界高血压了，所以建议你目前继续观察你的血压。最好坐着量。躺着呢，全身会相对比较放松，所以血压可能会比坐着偏低一些。

三、为什么躺着量血压低坐起来就高

坐着是标准的测量体位，实在不能坐才会躺着量。正常血压范围是指坐姿量的。这个要明白。

四、躺着量血压和坐着量血压每次都不同？

一般情况下电子血压计较台式血压计误差较大，你可以试用台式血压计来检测血压，测试的最佳时间是清晨醒来，躺在床上，测试部位肘窝关节内侧动脉搏动处。记住一定要每一天同一个时间测试，只有这样，你才能够判断你的血压是否稳定。正确的测量血压的方法(水银台式血压计) 1. 被测者把肘臂伸直，掌心向上，与心脏在同一水平上。 2. 将听诊器置于，肱动脉平

第4肋软骨.把袖带平整的缠在上臂中部(松紧以能放入一指为宜)袖带下缘距离肘窝2-3厘米.挤压输气球打气至肱动脉搏动音消失,水银柱又升高20-30mmHg后,慢慢的放气,使水银柱下降,视线与水银柱刻度平行. 3.
在听诊器中听到的第一声,水银柱所指刻度为收缩压;
当搏动音消失或减弱时,所指刻度为舒张压. 4.
测量后,放尽袖带中的空气,解开袖带.测血压完毕.
测后,将血压计右倾45°,关闭气门,气球放在固定的位置,以免压碎玻璃管.
收缩压 / 舒张压 如120 / 80mmHg

五、为什么量血压时坐着和躺着不一样【坐着95】

你好,体位不同是有可能使血压不一样的,但是不会有这么大的偏差,应该是测量的方法不对造成的,根据你提供的信息分析,你的已经是高血压了,建议到医院检查一下,在医生的指导下降压治疗。
希望可以帮到你,祝你早日康复。

六、为什么我平躺测量血压和坐着测量血压值不一样,躺着正常,坐着高压140,低压90

坐着与躺着的血压即便有一点偏差,但差的不会太多的。
你这个已经是临界高血压了,所以建议你目前继续观察你的血压。
最好坐着量。
躺着呢,全身会相对比较放松,所以血压可能会比坐着偏低一些。

七、量血压(躺着高,坐着低)

只要保持量血压的上臂和心脏水平,坐卧都是一样的。
你刚起床前血压高而活动后血压低,是医学上说的高血压患者的晨峰现象,是外周血管阻力大,和血液的粘度大造成的。
建议你用一天一次的长效降压药。
并检查身体。

配合中药活血化瘀治疗。
您的病情已经了解，建议：您的病情已经了解，建议：

参考文档

[下载：躺着量血压为什么比坐着低很多.pdf](#)

[《msci中国股票多久调》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[《股票流通股多久可以卖》](#)

[下载：躺着量血压为什么比坐着低很多.doc](#)

[更多关于《躺着量血压为什么比坐着低很多》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/52720420.html>