

测量丁丁用什么量比较准-怎么测量jj周长-股识吧

一、怎么测量jj周长

用软尺绕jj粗处一圈

二、JJ勃起的测量法??

只有勃起的时候才好量，而且是最准确的

三、用皮尺怎样量自己的睾丸

临床资料表明，睾丸扭转并不罕见，各个年龄段均可发生，但以青少年发病率最高。

睾丸扭转常因缺血过久，而破坏睾丸生精和内分泌功能，出现睾丸萎缩、坏死等严重后果。

专家指出，睾丸扭转后的缺血情况，与扭转程度及持续时间相关，扭转的程度越大，缺血越严重，挽救的机会就越小。

据医学家的研究报告，睾丸缺血1小时，损害可逆；

缺血5小时，大部分睾丸尚可挽救；

8小时以上，出现不可避免的睾丸坏死；

如超过24小时，患侧睾丸的功能可能会永远失去。

夜间睡眠中或凌晨等易发生睾丸扭转。

尤其是男孩进入青春期后，阴茎夜间勃起增加，伴有局部肌肉的收缩，可引起睾丸旋转。

那些有潜在的先天发育异常，如引带过长或缺如，或精索的固定点高，或患有隐睾，或隐睾伴有斜疝的男孩，阴茎夜间勃起时睾丸活动增加，容易扭转，不能自行恢复时就会出现症状。

多数睾丸扭转病人会突然发生一侧阴囊肿胀、触痛，精索增粗，疼痛可牵涉波及到下腹部、腹股沟或大腿。

部分病人还可能伴有恶心、呕吐、发热、行走不便等症状。

日常生活中，不少男子对睾丸扭转麻痹大意，疼痛时一忍再忍，以致延误了早期治疗，个别人因此丧失生育能力，酿成终生不幸。

专家建议，一旦发生睾丸扭转，尤其是青少年，要立即解除扭转，恢复睾丸供血，

以挽救睾丸，防止并发症。

睾丸扭转早期，可用手法复位。

但由于手法复位后的睾丸未得到固定，仍有再次扭转的可能，而且手法复位难以判断睾丸的缺血情况，所以建议最好能及时去专业男科医院检查诊治，采用手术治疗。

此外，治疗后要请医生做精液常规检查，以了解病侧睾丸及对侧睾丸的功能，这一点对未婚男青年显得更重要。

四、阴茎应该从什么地方开始测量啊？

在测量阴茎时应该在室温、自然状态下进行，尺子要紧紧抵住耻骨，一些人没有注意这些使得测量不准，特别是肥胖者，会阴和耻骨上脂肪很厚，会使阴茎看起来很短小，而实际是正常的。

阴茎长度因各人的情况不同，差别也比较大，作为大多数男性来讲，性成熟期是18周岁，基本发育就差不多了。

五、拿什么量屌的粗细大小啊 怎么量啊

用尺量

六、测量JJ的工具

如果你要非常准确最好用螺旋测微器如果你没有的话最好还是用直尺，如果没有办法量就割下来量，量好了在用520胶粘回去把

参考文档

[下载：测量丁丁用什么量比较准.pdf](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《30万买股票能买多久》](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[《股票放多久才能过期》](#)

[下载：测量丁丁用什么量比较准.doc](#)

[更多关于《测量丁丁用什么量比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/42341415.html>