

## 为什么右手量的血压比左手量的低 - - 量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？-股识吧

### 一、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？

正常。  
最准确的血压是量左手的。

### 二、我的左臂血压正常右臂血压很低是怎么回事

正常情况下，右臂血压较左臂血压更接近主动脉压，所以，测血压首选右臂。  
正常人右臂比左臂血压高5 - 10mmhg、下肢比上肢高20 - 40mmhg。

优势侧上肢血压较高。

右撇子人多为右侧高，左撇子人左侧高。

优势侧上肢的臂围较大，用同样宽的袖带，测出的血压值就高。

也可见于多发性大动脉炎锁骨下动脉闭塞，远端的椎动脉回流所致。

先天性动脉畸形，锁骨下动脉窃血的患者左上肢所测血压较低。

脑卒中患者病侧上肢的血压可较高或较低。

所以，正确的做法是：测血压时，首先要测量双侧上肢的血压，以确定两上肢血压的差异。

如果一侧上肢所测血压较高，则以后要用该侧上肢测量血压。

被测量者最好坐于有靠背的座椅上，裸露出右上臂，上臂肘部、心脏、水银柱“0”点应基本在同一水平。

特殊情况下可以取卧位或站立位。

(并查看水银柱应在0点。

)

### 三、为什么测血压左右手结果不一样

您好：人体的血压本来就是处于动态变化当中，不同医生测量确实也可能会有有一定误差，这也正是为什么诊断高血压至少要求由不同医生不同时间测量三次以上达到高血压标准。

测量还是以水银柱血压计由医生测量更为准确。

建议您可到当地医院心血管内科诊治。

## 四、左手和右手的血压哪只测出来准确

左手一般情况下人的右手血压比左手血压是要高10~20mmHg。

这是因为测量血压时测的是肱动脉的血压。

右手肱动脉来自头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。

而头臂干和左锁骨下动脉都来源于主动脉，头臂干是主动脉的大分支，所以头臂干的血压自然比左锁骨下动脉要高，测量的右肱动脉就比左肱动脉血压要高了。

正常双侧上肢血压差别在5--10mmHg，若超过此范围，属于异常。

见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。

所以，测左侧还是右侧，一般来说，差别不会很大。

## 五、量血压应该用左手还是右手？两手量出来的一样吗？不一样是为什么？

哎哟我擦。

。刚好过几天要考这个。

有背过阿。

。

。

测血压的话两只手都可以的。

一般来说右上肢血压约高于左上肢10~20mmhg。

影响血压的因素挺多的。

。

。

以收缩压的改变为主。

比如说正常情况下血压最低在清晨。

最高则在傍晚。  
立位血压高于坐位。

◦  
坐位血压又高于卧位。

◦  
还有就是情绪激动，剧烈运动。

◦  
吸烟什么的也可导致收缩压升高。

◦  
最后说的是你要是想确保测出来的血压值尽量准确点就得做好四定。

◦  
◦  
定时间。  
定部位。  
定体位。  
定血压计。

◦  
◦  
◦

## 六、为什么右手血压比左手更高

一般高10mmHg以下正常，如果高的超过10mmHg了，不要忽视，要到医院查一下血管是否有问题。

## 七、为什么左上肢比右上肢血压低？

左上肢离心脏近

## 八、为什么测血压左右手结果不一样

您好：人体的血压本来就是处于动态变化当中，不同医生测量确实也可能会有一定误差，这也正是为什么诊断高血压至少要求由不同医生不同时间测量三次以上达到高血压标准。

测量还是以水银柱血压计由医生测量更为准确。

建议您可到当地医院心血管内科诊治。

## 九、左右手的血压为什么不一样？

右手比左手粗！

### 参考文档

[下载：为什么右手量的血压比左手量的低.pdf](#)

[《股票增发预案到实施多久》](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[下载：为什么右手量的血压比左手量的低.doc](#)

[更多关于《为什么右手量的血压比左手量的低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/48707795.html>