

体温量哪里比较准确 - - 体温计测体温在哪里测会更加准确啊？-股识吧

一、温度计一般测量那比较准确？

如果是指室内温度，温度计放在房间近中央高度1.5米的地方测量的是室内的温度。

二、哪种体温计测量更准确？

肯定是传统的玻璃水银温度计

三、体温表放在哪量比较准

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高 $0.3 \sim 0.5$ 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使用。

正常值为： $36.3 \sim 37.2$

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低 $0.3 \sim 0.6$

四、体温计哪个部位测的准

肛门处体温最接近实际体温。

每日早晚、人体各个部位及男女之间的体温均存在着差异。

人体正常体温有一个较稳定的范围，但并不是恒定不变的。

正常人口腔温度(又称口温)为 $36.2 \sim 37.2$ ，腋窝温度较口腔温度低 $0.2 \sim 0.5$ ，直肠温度(也称肛温)较口腔温度高 $0.2 \sim 0.6$ 。

一天之中，清晨2~5时体温最低，下午5~7时最高，但一天之内温差应小于 0.8 。

另外，女子体温一般较男子高0.35 左右。

女子体温在经期亦有些许变化。

在健康状态时，如饮食正常，衣着适宜，人体的体温一般是比较恒定的，即保持在37 上下(大致介于36.2 ~ 37.2)，而不因外界环境温度的改变而变化。

人体正常体温平均在36~37 之间（腋窝），超出这个范围就是发热，38 以下是低热，39 以上是高热。

[1] 测量体温一般常用3个部位，即口腔、腋窝及肛门：

儿童正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

儿童在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

儿童在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

通过测量后，儿童凡超过正常范围0.5 以上时，称为发热。

不超过38 称为低热，超过39 者为高热。

五、体温计在哪量最准

肛温和口温最准，一般量三分钟，如果是量腋温的话要量十分钟，因为腋窝温度较口腔温度低。

0.3 ~ 0.6 所以量腋温的话最好加0.5，其实不加也可以

六、体温表放哪儿量体温最准确？

正常人的体温保持在相对恒定的状态，其正常波动范围为：口腔温度：36-37摄氏度
直肠温度：比口腔温度高0.3-0.5摄氏度
腋下温度：比口腔温度低0.3-0.5摄氏度。

测量方法：体温表有口表与肛表两种。

测体温前，先将体温表水银柱甩到35摄氏度以下，再用酒精棉球消毒体温表。

腋下测温法：先擦去腋窝的汗液，将口表有水银柱的一端置于腋窝深处，屈臂过胸将之夹紧，10分钟后取出。

直肠测温法：先将肛表水银圆端涂点油类润滑，再慢慢插入肛门3-5厘米，并用手扶住肛表上端，3分钟取出。

口腔测温法：应在进食、喝水或吸烟后半小时进行。

将表斜放于舌下，让病人紧闭口唇，牙齿不要咬合，3分钟后取出。

看体温表数字时，应横持体温缓慢转动，取水平线置观察水银柱所示温度刻度。

体温表用完后用75%酒精消毒。

腋下测温法简便、安全、卫生舒适，现多采用此法。

昏迷病人或婴幼儿可采用肛表测温。

七、体温计测体温在哪里测会更加准确啊？

这也算交通出行的问题？体温计如果是汞柱的老式体温计，分肛表，口腔表等，分别放在对应位置测。

- 。
- 。
- 。

八、体温怎么量最准

正常都是测腋下的也就是腋下测量法操作如下：先将体温计的水银汞柱甩到35度以下，再将体温计头端置于受测者腋窝深处，用上臂将体温计夹紧，5到10分钟后读数。

读数方法是一手拿住体温计尾部，即远离水银柱的一端，使眼与体温计保持同一水平，读出水银柱右端所对的数字。

读数时注意千万触碰不要体温计的头端，这样手会影响水银柱而造成测量不准；眼睛不要高于或低于体温计。

九、量体温量哪最准？

新生儿测量体温的话，可以用电子体温计，速度比较快，一分钟就可以搞定，可以选择在宝宝的脖子处，或是腋窝处进行测量，也可以通过口腔进行测量的。

参考文档

[下载：体温量哪里比较准确.pdf](#)

[《股票账户多久没用会取消》](#)
[《股票持股多久可以免分红税》](#)
[《股票卖出后多久能确认》](#)
[《股票卖出后多久能确认》](#)
[《股票正式发布业绩跟预告差多久》](#)
[下载：体温量哪里比较准确.doc](#)
[更多关于《体温量哪里比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/20538692.html>