

幼猫怎么量体温比较准确...幼猫体温39度2正常么？-股识吧

一、一般小猫超过多少度算发烧？

一般小猫超过多少度算发烧?动物的体温比我们要高

二、猫发烧的问题~！！

我养了两只猫，我的大猫已经做完绝育.是个公猫.不过母猫的我也懂一些.猫的恢复能力很好.母猫大概七天左右就能恢复正常了，做完绝育要给他带上伊丽莎白头套，头套千万不要给摘下来，因为它会舔伤口，伤口会发炎，对猫咪不好，还要再去医院。

头套要等伤口愈合了再摘下来，还有注意不要让他蹦蹦跳跳的，容易碰伤伤口。还有猫砂尽量换成水晶猫砂，因为没有粉尘，会对伤口好一些，另外要注意给他保暖，猫咪这个时候抵抗力很差，容易发烧.还有做完绝育的第一天晚上可能会失禁，我的猫咪就尿在床上。

三天左右猫咪就会恢复健康了，如果有发炎发烧等症状要赶紧去医院.猫在这个时候不要给他吃东西，或者尽量吃少一点，减少他排泄的次数.对伤口不好.吃得少很正常，鼻子凉的也很正常.猫咪的体温比人的高，正常在四十二度左右，你可以把体温计放在他腋窝里量一量.要注意保暖还有，人和猫的病是互相不传染的，不用担心.祝你的猫咪早日康复.

三、幼猫体温39度2正常么？

正常温度约为摄氏38.6度，但是可能上下波动.不过，我认为体温在39.2度以下，猫没有发烧~你家猫应该没大事了，能吃能喝就说明身体再慢慢恢复了，现在就是注意保暖就对了，不要被风吹到，体温应该是正常的~小猫的体温有时就是会稍微高一点，和大猫不同的，没大事的~

四、猫量体温腿和屁股差多少度

我不会~~~但还是要微笑~~~：)

五、小猫体温比平时高通常是怎么回事？

一般在38.5度属于正常的~高过39.5度就属于高了~测体温的话可以把温度计夹在大腿和肚子之间的地方，还有吐这件事对于猫来讲虽然平常但不是什么好事~猫是讲究卫生的动物，平时要多给它刷毛.假如吐的是黄水就需要去医院检查了，有可能是肠胃病或是猫瘟，我家的猫就得了猫瘟现在正在治疗，真心疼啊.

六、2个月的小猫不吃东西也很少喝水，量了体温是38.5自己量的。也不活泼了。

有可能是因为猫肚子有虫，到兽医点买拜尔驱虫药一粒，给猫吃四分之一。或者咨询兽医，看看是什么情况。
希望能帮助到你

参考文档

[下载：幼猫怎么量体温比较准确.pdf](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《股票涨30%需要多久》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：幼猫怎么量体温比较准确.doc](#)

[更多关于《幼猫怎么量体温比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/22105800.html>