

成年比熊怎么量体温：如何给狗量体温?狗的正常体温应该是多少度?-股识吧

一、5个月比熊一般体温是多少

正常体温是38.5---38.9。

二、比熊体温低怎么办

赶快换一个宠物医院吧！体温低是非常危险的！尤其是3个月左右的小狗，还有年龄大的狗狗，我家狗3个多月的时候就是突然没精神，然后送到医院去，以为是发烧，结果是体温低，医生赶紧给吊针，半夜吊针到快早上，吊针的时候用暖水袋保暖，终于给把体温热上来了，然后又打了2天吊针，才好的。

医生也说不明白是什么原因，但是住院是没错的，毕竟医院里面什么都有，在家里万一有什么事根本来不及。

我觉得你赶快换一家负责任并且技术好的医院，别耽搁了！！希望lz的狗狗快点好起来！！

三、怎么给狗狗量体温?

狗的正常体温介於摄氏37.7到39.2度之间。

根据宠物的性情，饲主可能可以帮宠物量体温。

请人帮忙按住宠物的背部后面、再用肛温计(记得绝对不可以用口温计量肛门的温度)。

首先彻底摇过温度计，让水银柱达到约35度，将温度计以矿物油或是凡士林润滑，抓住然后提高宠物的尾巴，轻轻地以转动的方式将温度计插入直肠到约长度一半，抓紧温度计与宠物尾巴并保持至少三分钟，然后移开温度计，看水银刻度，如果宠物的温度高过摄氏39.4度(通常是发烧的指标)或是低於37.7度，请立即谘询兽医

。

将体温计夹在犬后腿腋下测量其体温，这种方法简单最常用。

方法二，把体温计消毒，插入肛门内，这一般需要两个人配合，一人固定狗的头部并使它安静，一人提起它的尾巴，轻轻插入温度计。

这种方法最好把体温计一头用绳子栓上！别全进去了！正常犬的体温在38~38.9，小型犬、活跃的犬会略高。

四、如何给狗量体温？狗的正常体温应该是多少度？

狗狗的正常体温是37.9~39.9之间，在这个范围内都属于正常。

另外就是幼年的狗狗比成年的狗狗的体温略高些。

给狗狗测量温度，一般都是测量直肠温度，也就是肛门。

你可以用体温表的水银那一头插入（消毒了的）狗狗的肛门，插入大概3~5厘米深度就行了，测量3~5分钟就行了。

五、怎么给小狗量体温啊？正常体温是多少？

正常值38-39度！一般为38。

5左右，下午体温偏高！小狗比成年狗体温高一点！

狗与人类一样，要想知道它的身体状况，就要先量体温。

量体温的方法是将水银温度计插入狗的肛门，稍等片刻，拿出观察即可。

狗的平均体温是38.0~39.0。

一般来说，幼犬和小型犬的体温高，大型犬的体温相对较低。

安静时，如果狗的体温与平常不同，请赶快带它去医院检查。

标准体温参照表 犬种 体温 幼犬 38.2~38.8度 玩具狗 38.0~38.5度 成犬 37.5~38.5

度 超大型犬 37.0~38.5度

参考文档

[下载：成年比熊怎么量体温.pdf](#)

[《出财报后股票分红需要持股多久》](#)

[《30万买股票能买多久》](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《财通证券股票交易后多久可以卖出》](#)

[下载：成年比熊怎么量体温.doc](#)

[更多关于《成年比熊怎么量体温》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/26546558.html>