

# 宝宝十几天了这两天吐奶量比较大怎么办我的宝宝二十二天了，这几天老是大口吐奶，怎么办？-股识吧

## 一、我孩子才10几天吐奶很厉害！是怎么回事？？？

婴儿，特别是新生婴儿很容易吐奶，而吐奶最怕的是奶水由食道逆流到咽喉部时，在吸气的瞬间误入气管，即呛奶。

而婴儿的神经系统刚刚发育，一些反射还很薄弱，他们不能把呛入呼吸道的奶咳出。

于是，常因奶液对气道机械性阻塞而发生窒息。

同时婴儿的大脑细胞对氧气十分敏感，若停止供氧5分钟，即可死亡，所以，呛奶很可能发生婴儿猝死的悲剧。

家长们如何把握分秒抢救自己呛奶的宝宝呢？轻微的溢奶、吐奶，宝宝自己会调适呼吸及吞咽动作，不会吸入气管，只要密切观察宝宝的呼吸状况及肤色即可。

如果大量吐奶，首先，应迅速将宝宝脸侧向一边，以免吐出物向后流入咽喉及气管。

然后，把手帕缠在手指伸入口腔中，甚至咽喉，将吐、溢出的奶水食物快速清理出来，以保持呼吸道顺畅，然后用小棉花棒清理鼻孔。

如果宝宝憋气不呼吸或脸色变暗时，表示吐出物可能已进入气管了，使其俯卧在大人膝上或床上，用力拍打背部四五次，使其能咳出。

如果仍无效，马上夹或捏刺激脚底板，使宝宝因疼痛而哭，加大呼吸，此时最重要的是让他吸氧入肺，而不是在浪费时间想如何把异物取出。

在以上过程中，宝宝应同时送往医院检查。

如果呛奶后宝宝呼吸很顺畅，最好还是想办法让他再用力哭一下，以观察哭时的吸氧及吐气动作，看有无任何异常，如声音变调微弱、吸气困难、严重凹胸等，如有应即送医院。

如果宝宝哭声宏亮，中气十足、脸色红润，则表示无大碍。

对常吐奶的婴儿，父母应加强观察，并适当抬高床头，让婴儿侧卧。

哺乳或喂奶时，都应让头部略高，喂完奶后，再把婴儿抱立起来，轻拍后背，直到打嗝后再放回床上。

夜间应定期观察婴儿，是否发生吐奶，呼吸与睡姿如何等。

另外，妈妈在给婴儿喂奶时，应防止奶头堵住婴儿的口、鼻，导致窒息。

## 二、我的宝宝二十二天了，这几天老是大口吐奶，怎么办？

宝宝有吐奶的现象很正常，由于宝宝的胃很小，且呈水平位，所以喂奶的时候要特别小心。

我家宝宝喝的是圣元，感觉还不错，这个牌子的奶粉接近母乳，宝宝也容易吸收。

### 三、十多天的宝宝老吐奶，怎么办？

小宝宝吐奶是正常现象，小的时候胃是呈水平状的。

吃多点或者是晃动宝宝都会吐奶，不用担心。

### 四、谁能告诉小宝宝总是吐奶该怎么办?(吃完也拍过了也还这样)

三个月以后就好多了

### 五、婴儿频繁吐奶

阿姨！吃奶的婴儿经常会有吐奶的现象，这是因为婴儿的胃呈水车，胃的容量小，贲门（紧接食管处嫩宽，关闭作用差，幽门（紧接小肠处僻交紧，而婴儿吃奶时又常常吸入空气，因此吃奶后奶汁容易从胃的贲门倒流入口腔，造成吐奶

、掌握好喂奶的时间间隔 一般说来，乳汁在胃内排空时间约为2~3小时，所以每隔3小时左右喂1次奶比较合理。

如果喂奶过于频繁，上一餐吃进的乳汁还有部分存留在胃里，这必然影响下一餐的进奶量，或是引起胃部饱胀，以至吐奶。

2.采用适宜的喂奶姿式 有的妈妈喜欢躺着喂奶，采用这种面对面侧卧哺乳的姿态式喂奶，婴儿吐奶的可能性增大。

如果妈妈抱起孩子喂奶，婴儿吐奶的机会就会减少。

因为怀抱的婴儿身体倾斜，胃的下口便相应有了一定的倾斜度、吸入的奶汁由于重

力作用可部分流入小肠。

使胃部分腾空。

因此，在进食等量乳汁的情况下，抱起孩子喂奶比躺着喂奶发生吐奶的机会要少。

3.喂奶后不要急于放下孩子 孩子完奶后，妈妈不应立即把他放回到床，而应竖直抱起，让宝宝趴在妈妈肩头，妈妈用手轻拍宝宝背部，让那些随吸切而吞入的空气排出，即让宝宝打嗝儿。

气体在胃中停留，占据一定的空腔是引起宝宝吐奶的重要因素，宝宝打完嗝儿，胃中气体排空，再放下就不易吐奶。

4.吃奶后不宜采取仰卧位 通常情况下，婴儿多采取仰卧位躺在床上。

但吃奶后为防止吐，最好不要马上置孩子仰卧位，应先右侧无吐奶现象后再让他仰卧。

## 六、我孩子才10几天吐奶很厉害！是怎么回事？？？

婴儿，特别是新生婴儿很容易吐奶，而吐奶最怕的是奶水由食道逆流到咽喉部时，在吸气的瞬间误入气管，即呛奶。

而婴儿的神经系统刚刚发育，一些反射还很薄弱，他们不能把呛入呼吸道的奶咳出。

于是，常因奶液对气道机械性阻塞而发生窒息。

同时婴儿的大脑细胞对氧气十分敏感，若停止供氧5分钟，即可死亡，所以，呛奶很可能发生婴儿猝死的悲剧。

家长们如何把握分秒抢救自己呛奶的宝宝呢？轻微的溢奶、吐奶，宝宝自己会调适呼吸及吞咽动作，不会吸入气管，只要密切观察宝宝的呼吸状况及肤色即可。

如果大量吐奶，首先，应迅速将宝宝脸侧向一边，以免吐出物向后流入咽喉及气管。

然后，把手帕缠在手指伸入口腔中，甚至咽喉，将吐、溢出的奶水食物快速清理出来，以保持呼吸道顺畅，然后用小棉花棒清理鼻孔。

如果宝宝憋气不呼吸或脸色变暗时，表示吐出物可能已进入气管了，使其俯卧在大人膝上或床上，用力拍打背部四五次，使其能咳出。

如果仍无效，马上夹或捏刺激脚底板，使宝宝因疼痛而哭，加大呼吸，此时最重要的是让他吸氧入肺，而不是在浪费时间想如何把异物取出。

在以上过程中，宝宝应同时送往医院检查。

如果呛奶后宝宝呼吸很顺畅，最好还是想办法让他再用力哭一下，以观察哭时的吸氧及吐气动作，看有无任何异常，如声音变调微弱、吸气困难、严重凹胸等，如有应即送医院。

如果宝宝哭声宏亮，中气十足、脸色红润，则表示无大碍。

对常吐奶的婴儿，父母应加强观察，并适当抬高床头，让婴儿侧卧。

哺乳或喂奶时，都应让头部略高，喂完奶后，再把婴儿抱立起来，轻拍后背，直到打嗝后再放回床上。

夜间应定期观察婴儿，是否发生吐奶，呼吸与睡姿如何等。  
另外，妈妈在给婴儿喂奶时，应防止奶头堵住婴儿的口、鼻，导致窒息。

## 参考文档

[下载：宝宝十几天了这两天吐奶量比较大怎么办.pdf](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《启动股票一般多久到账》](#)

[《股票发债时间多久》](#)

[下载：宝宝十几天了这两天吐奶量比较大怎么办.doc](#)

[更多关于《宝宝十几天了这两天吐奶量比较大怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/28613861.html>