

# 剪股颖草坪为什么黄--剪股颖草坪冬天是绿色的吗？-股识吧

## 一、护坡植物有哪些护坡种草

园林护坡植物的选择一般应掌握如下原则：一是生长快，适应性强，病虫害少的植物；

二要耐修剪，耐瘠薄土壤，深根性的植物；

三是管理粗放，抗风，抗污染，有一定经济价值的植物；

四是造型优美，枝叶柔软而长，有一定观赏价值的植物。

园林护坡植物主要有三种：一、灌木。

灌木是指那些没有明显的主干、呈丛生状态比较矮小的树木，一般可分为观花、观果、观枝干等几类，矮小而丛生的木本植物。

是多年生。

一般为阔叶植物，也有一些针叶植物是灌木。

适宜在园林绿化中护坡的灌木有：胡枝子、紫穗槐、迎春木樨、沙地柏、果桑、三裂绣线菊、紫叶矮樱、女贞、小叶女贞、紫叶小檗等。

二、攀缘植物。

攀缘植物是能抓着东西爬的植物。

攀缘植物根系深长，对土壤条件要求不高，

抗病虫害，具有良好的耐旱、耐热、抗寒、耐瘠薄能力，适应性很强。

适宜在园林绿化中护坡的攀缘植物有：爬山虎、扁豆、丝瓜、牵牛花、茑萝、葛藤、常春藤、葡萄等。

三、草坪。

草坪是用多年生矮小草本植株密植，并经人工建植、人工修剪、人工养护管理的草地。

草坪草包含很多系列品种：如早熟禾 四季青 冷季型 混播草坪等，而每一个草坪系列有包含上百种草坪品种，其中人们最为常见的属早熟禾草坪草，早熟禾草坪草是绿化行业使用量最大，种植面积最广的一个草坪品种。

适宜在园林绿化中护坡的草坪有：结缕草、野牛草、狗牙根草、地毯草、钝叶草、假俭草、黑麦草、早熟禾、剪股颖等。

## 二、匍匐剪股颖养护

匍匐剪股颖又叫茎剪股颖、本特草，为冷地型草坪草，是禾本科剪股颖属多年生草本植物。

具有长的匍匐，节着土生有不定根。

性喜冷凉湿润气候，耐荫性强于草地早熟禾，不如紫羊茅。

耐寒、耐热、耐瘠薄、较耐践踏、耐低修剪、剪后再生力强。

耐盐碱性强于草地早熟禾，不如多年生黑麦草。

对土壤要求不严，在微酸至微碱性土壤上均能生长，最适pH值在5.6 - 7.0之间。

绿期长，生长迅速，适于寒带、温带及亚热带的广大地区种植。

被广泛应用于高尔夫球场果岭球道、足球场、保龄球场等运动场的绿化。

一、正确选择草种 绿冠草业中心为您提供了来自世界一流种子公司、适应不同建植条件的优秀的匍匐剪股颖品种，请您根据当地的自然气候条件以及建坪要求来选择品种。

如果您对选择草种信心不足，可向绿冠草业垂询，我们的专业技术人员愿为您免费提供适宜的草种配比方案。

二、坪床的准备 因种粒细小，在播种前，根据土壤状况，清除土壤表层0-30cm中的杂物，然后仔细平整土地，以得到一块疏松、透气、平整、排水良好、适于草坪草生长的坪床。

若土壤贫瘠，要施用有机肥或复合肥增加肥力。

三、播种与成坪 播种可在春秋两季进行。

播种量：8-10克 / 平方米。

播种量随品种、地区、时间、用途的不同而略有差别。

播种前一天浇透水，次日在表土半湿半干的情况下再播种。

为了获得健壮的幼苗，播种时带少量的种肥是有必要的。

播种后，表面覆上表土，以不露出种子为宜。

切忌覆土过深，而且要每天浇水，保持土壤湿润。

这样在7-28天可出苗。

出苗后，应保证土壤湿润和注意除草。

四、养护与管理 1、修剪匍匐

剪股颖适宜的留茬高度为0.5-1.5cm，高尔夫球场果岭区为0.5-0.7cm。

原则是每次剪去草高的1/3。

在生长旺盛期，要及时修剪草坪，如果草层生长过密，基部叶片会因通风透气不良而变黄枯死。

在抽穗前增加剪草。

如果草长得过高，可以通过多次修剪达到理想的高度。

每次修剪应改变方向，以促进草直立生长。

2、施肥 剪股颖性喜肥，在北方春季施肥，南方秋季施肥，尤其在土壤肥力低的条件下，每年早春和晚夏施两次肥。

化肥和有机复合肥均可作为草坪肥料施用。

一般土壤全价化肥的施用量为20公斤 / 亩，氮：磷：钾控制在5：3：2为宜。

- 3、灌溉 葡萄剪股颖性喜湿润，需水相对较多，应充足供水以保持叶片色泽碧绿。在年降雨量低於1000mm的地区，需要人工灌水。在湿润地区，干旱时进行灌溉也是非常必要的。浇水应避免中午阳光强烈的时间，应浇透、浇足，至少湿透5厘米。一般绿地在秋末草停止生长前和春季返青前应各浇一次透水，这对草坪越冬和返青十分有利。
- 4、覆土 在已建成的草坪上覆土，有多种目的，包括控制枯草层、平整坪面、促进匍匐节间的生长及发育改善土层的通透性，易于进行修剪。将沙、土壤和有机质混合，均匀施入草坪中。一次施量应小于0.5厘米。
- 5、杂草与病虫害防治 您若按以上基本措施管理您的草坪，它的抗杂草和抗病虫害能力会大大增强。如果有杂草和病虫害出现，请您及时向当地的草坪专家请教防除方法，也可向绿冠草业的草坪植保专业技术人员垂询。

### 三、葡萄剪股颖草坪冬季会发黄么

应该叫匍匐剪股颖，冬季在湖北会发黄，只是部分发黄，如果养护好如水肥条件及种植地域适宜就应该是绿的

### 四、绿化台湾草皮有没有枯黄的时候?

- (1) 草坪杂草的定义 草坪杂草是草坪上除栽培的草坪植物以外的其他植物。草坪杂草的概念是相对的，如苇状羊茅是草坪草种类之一，但若出现在精美的剪股颖草坪中也被认为是一种杂草。杂草可通过风、水、鸟类、动物和人类传播。
- (2) 草坪杂草的类型 按除草剂控制杂草的类别分类。可分为3大类：
  - a.本科杂草（尖叶草）。叶片长条形，叶脉平行，茎切面为圆形，根为须根系。
  - b.阔叶杂草（圆叶草）。叶片宽阔，叶脉网纹状，茎切面为圆形或方形，根为直根系，有主根。
  - c.莎草科杂草（三棱草）。叶片长条形，叶脉平行，茎切面为三角形，根为须根系。按生存环境分类。

可分为水生型、湿生型、旱生型3类。

以旱生型为主。

按生育期分类。

可分为一年生、二年生和多年生3种类型。

a.一年生植物。

从种子起在1年内完成生命周期。

它包括冬型一年生植物（夏末或秋初萌发至次年夏季死亡）和夏型一年生植物（夏天萌发至秋季第一次严霜后死亡）。

b.二年生植物。

能活1年多，但不超过2年的植物。

c.多年生植物。

生长成活2年以上的植物。

既可以种子繁殖，又能以营养器官繁殖，通常以营养器官休眠越冬。

多年生杂草耐药性比其他两类杂草要强，防治难度要大。

依分类学特点分类。

可分为单子叶杂草和双子叶杂草两大类。

单子叶草坪杂草多属禾本科，少数属莎草科。

其形态特征是无主根，叶片细长，叶脉平行，无叶柄。

双子叶杂草与单子叶杂草相比，叶片较宽。

（3）草坪杂草的危害草坪杂草的危害是多方面的，具体如下：影响草坪草的生长发育，杂草通常与草坪草竞争阳光、水分、营养，降低草坪草的生活力。

有些杂草是一些病虫害的寄主植物，使草坪草病虫害加剧。

损害草坪的整体外观。

影响人畜安全，如毒麦种子有毒，打碗花和罌粟的乳汁有毒。

（4）草坪杂草的防治方法草坪杂草的防治方法主要有农业防治、生物防治和化学防治，见表8-3。

表8-3 草坪杂草的防治方法表8-3 草坪杂草的防治方法（续）-1

## 五、剪股颖草坪冬天是绿色的吗？

剪股颖草坪冬天是绿色的剪股颖草坪四季都是绿色的  
夏季养护需要注意可以搜我的用户名

## 六、绿化台湾草皮有没有枯黄的时候？

正常的草坪会在冬季枯黄，但有一些品种冬季则不会枯黄例如：黑麦草草坪  
高羊茅草坪剪股颖草坪 台湾草草坪属暖季型草坪 冬季会出现休眠现象。

## 参考文档

[下载：剪股颖草坪为什么黄.pdf](#)

[《股票做双头是什么意思》](#)

[《课程配对比较量表怎么写》](#)

[《平安怎么开通创业板交易权限》](#)

[《反人性的股票怎么做》](#)

[《怎么买yg股票》](#)

[下载：剪股颖草坪为什么黄.doc](#)

[更多关于《剪股颖草坪为什么黄》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/75074879.html>